

# WERKPROTOCOL VOEDING JONGE VOGELS



Protocolnummer: DV.2015.1.

DATUM: 02 juni 2015

Verantwoordelijke: PD & AD

Dit protocol is opgesteld door Paul Deuning & Antoine Deley. Tot een vernieuwde versie zal dit protocol gelden. Voor vragen, aanpassingen en/of opmerkingen: mail naar [p.deuning@dierenambulancenijmegen.nl](mailto:p.deuning@dierenambulancenijmegen.nl) met onderwerp DV.2015.1.

## **A. ALGEMENE INFORMATIE:**

De eerste periode, als de vogels nog niet volledig bevederd zijn hebben deze extra veel energie nodig. Papjes van universeelvoer, eivoer of geweekte zaden voldoen niet of zijn niet praktisch. Nutribird biedt dan alle voedingsstoffen en is makkelijk aan te bieden door middel van een spuitje of zonde.

## **B. VOORBEREIDING:**

1. Zorg voor een schone werkomgeving, **werk hygiënisch en schoon!**
2. Leg een schone doek op je werkplek waarop je de schone materialen kunt leggen
3. Kijk hoeveel dieren gesondeerd moeten worden
4. Zet sondeerpotjes klaar
5. Leg vorkjes klaar
6. Leg spuitjes klaar
7. Zet de waterkoker met water aan
8. Nadat het water gekookt is het te gebruiken sondeerpotje met vorkje en spuitje erin volschenken
9. Wat kokend water opzuigen met de te gebruiken spuit (eventueel met sondeerslang erop) en weer leegspuiten
10. Sondeerpotje leeggooien
11. Alle schone materialen op de schone doek leggen

## **C. AANMAKEN NUTRIBIRD:**

1. Kijk hoeveel het te sonderen dier weegt
2. Neem 10% van het lichaamsgewicht

**Voorbeeld: vogel weegt 240 gram x 0,10 = 24 milliliter**

3. Vul het sondeerpotje met ruim de bij punt 2 berekende hoeveelheid gekookt water
4. Voeg beetje bij beetje wat Nutribird toe tot het een dikte van vla bereikt
5. Blijf ongeveer gedurende 1 minuut roeren
6. Klontjes zoveel mogelijk vermijden, ze zijn goed tegen de wand van het sondeerpotje kapot te drukken en door zorgvuldig en voorzichtig toevoegen van Nutribird aan het kokende water vermijd je ook klontjes
7. Nutribird in de schoongemaakte spuit opzuigen
8. Druppel wat Nutribird uit de spuit op je pols
9. Als het brandt, is het te heet en moet het nog wat afkoelen, het moet lekker warm aanvoelen
10. Mocht je je eigen gevoelstemperatuur niet vertrouwen dan kun je een thermometer gebruiken, de temperatuur moet plusminus 39 °C zijn

**In de eerste 3 weken is de temperatuur van de voeding erg belangrijk, gebruik dan altijd een thermometer. Indicatie voor de eerste drie weken is of de vogel volledig bevederd is.**

11. Indien nodig sonde op de spuit zetten en de sonde zelf tot de opening volspuiten met Nutribird om de voeding te ontlichten
12. Elke voederbeurt dient Nutribird opnieuw aangemaakt te worden

#### D. HOEVEELHEID VOEDING:

LEEFTIJD	HOEVEELHEID	
	Nutribird	Water
Dag 1 - dag 2	1 deel	6 delen
Dag 2 - dag 3	1 deel	5 delen
Dag 3 - dag 4	1 deel	4 delen
Dag 4 - dag 5	1 deel	3 delen
Dag 5 - zaden eten	1 deel	2 tot 2,5 delen

#### E. FREQUENTIE VOEDINGEN:

1. Erg jonge vogels om het uur
2. Kleine wat oudere vogels om de 1,5 uur
3. Grote wat oudere vogels om de 2 uur, alleen als krop leeg is


Voor duiven volg punt E en voor sperrende vogels punt F

#### F. VERSCHILLENDE SOORTEN SONDEERVOEGINGEN:

1. Nutribird A19: Kleine zangvogels
2. Nutribird A21: Duiven en kraaiachtigen
3. Nutribird A18: Zwanen, eenden en dergelijke

#### G. DUIVEN:

1. Controleer of de krop van de duif echt leeg is, pas sonderen als de krop leeg is anders ontstaat er kropverzuring
2. Wikkel de duif in een hanteerdoek
3. Open de bek door de bovenzijde van de snavel vast te pakken
4. Breng de sondeerslang met de andere hand naar de krop



5. Spuit de nutribird rustig direct in de krop, voel tijdens het sonderen hoe vol de krop is, vol is vol, er moet wat speling in de krop blijven, het moet geen strak opgeblazen ballon zijn
6. Verwijder de slang rustig uit de bek van de duif en zet de duif terug in het hok.
7. Na het sonderen spullen gelijk schoonspelen, ontsmetten en opbergen

## H. SPERRENDE VOGELS:



Andere jonge vogels gaan sperren (kop omhoog, snavel open) als ze gestoord worden. Vaak poepen ze ook meteen of vlak daarna, ook al hebben ze niks gekregen. Als dit te vaak gebeurt kunnen de darmpjes verkleven. Daarom is het belangrijk om de jonge vogels zo min mogelijk te storen. Mede ook om niet steeds het nest te hoeven verschonen. Deze vogeltjes mogen met een spuitje gevoerd worden, alsof je de moeder bent en aankomt vliegen.

1. Controleer voor je begint met voeren of de nutribird nog op de juiste temperatuur is
2. Gebruik voor het voeren een spuit, maat is afhankelijk van het formaat van de vogel, gebruik per vogel een nieuwe spuit, bij een heel nest dat bij elkaar zit hoeft dit niet
3. Zuig met de spuit de voeding op en biedt dit aan het dier aan
4. De vogels zullen blijven vragen om voeding tot ze vol zitten
5. Na de voersessie even wachten tot de vogels ontlast hebben en het nest verschonen
6. Na het sonderen spullen gelijk schoonspelen, ontsmetten en opbergen
7. Na het voeren even wachten, na het eten ontlasten deze vogels vrijwel altijd, hygiëne is belangrijk dus ververs in dat geval gelijk het nest.